

8. FUE - PREOPERATIEVE INSTRUCTIES

We verzoeken u vriendelijk om de onderstaande instructies strikt na te leven zodat we u een optimale medische zorg kunnen bieden. Indien deze instructies door u niet worden nageleefd, zou het kunnen dat uw behandeling omwille van medische veiligheidsredenen uitgesteld of geannuleerd dient te worden.

Bloedonderzoek

Een bloedonderzoek is in principe niet nodig bij gezonde en jonge patiënten. Indien u lijdt aan een noemenswaardige fysieke aandoening, is een bloedonderzoek echter vereist. Indien u de bloedafname door de huisarts laat uitvoeren, dient er een standaard preoperatief bloedonderzoek uitgevoerd te worden (tenzij anders vermeld door Dr. Feriduni).

Gebruik van alcohol

Drie dagen voor de behandeling kunt u beter geen alcohol nuttigen. Alcohol stimuleert de bloedtoevoer en de overgevoeligheid aan verdovende medicatie.

Gebruik van medicatie

Ontstekingsremmers en acetylsalicylzuur houdende medicatie zoals bijvoorbeeld aspirine, mogen 7 tot 10 dagen voor de behandeling niet meer ingenomen worden. Indien u twijfelt, vraagt u best raad aan uw huisarts of apotheker. Dit geldt ook voor stimulerende en verdovende middelen. Indien u medicatie tegen bloedstollingziektes, zoals bijvoorbeeld cumarinehoudende middelen, of antidepressiva gebruikt, verzoeken wij u dit te melden tijdens het consult. U kunt voor uw behandeling uiteraard ook telefonisch contact opnemen met ons. Voorgeschreven medicatie dient u mee te nemen naar de kliniek en te tonen aan Dr. Feriduni.

Roken

We raden u aan om voor uw behandeling op z'n minst 24 uur niet te roken, roken vertraagt de wondheling en verhoogt het risico op infecties.

Inname van vitamine B of E

De inname van vitamine B of vitamine E zou een week voor de behandeling stilgelegd moeten worden aangezien deze producten de bloedtoevoer verhogen.

Gebruik van Propecia

Finasteride is een belangrijke toevoeging aan een haartransplantatie en daarom mag de inname worden voortgezet.

Gebruik van Minoxidil lotion

Minoxidil lotion mag u blijven gebruiken tot 1 dag voor de behandeling, 2 à 3 weken na de behandeling kunt u het gebruik van Minoxidil hervatten. Minoxidil lotion bevat het ingrediënt propyleenglycol, hetgeen de huid na de behandeling kan irriteren en uitdrogen.

ARNICA D30

Na de behandeling zal er waarschijnlijk een zwelling optreden ter hoogte van het gelaat, dit kan een 5 à 7-tal dagen aanhouden. ARNICA D30 van UNDA kan preventief ingenomen worden (dit zorgt voor een minder geprononceerde zwelling maar is geen wondermiddel).

Comfortabele kleding

Wij raden u aan om op de dag van de behandeling comfortabele kleding te dragen, dat niet over het hoofd aan of uitgetrokken moet worden. Voor de behandeling ontvangt u van ons operatiekleding en –schoenen die u tijdens de ingreep zult dragen. Gelieve geen waardevolle juwelen of voorwerpen mee te nemen naar onze kliniek op de dag van de behandeling.

Ontbijt

Op de dag van de behandeling doet u er goed aan 's morgens een licht ontbijt te nuttigen, er is immers een lunch voorzien tijdens de pauze van de behandeling. Ook een goede nachtrust voor de behandeling is ten zeerste aanbevolen.

Tijdstip operatie

Op medische gronden bestaat de mogelijkheid dat het tijdstip van de behandeling veranderd wordt, daarom verzoeken wij u om de dag vóór de behandeling telefonisch bereikbaar te zijn en op de dag van de behandeling vanaf 07.00 uur telefonisch bereikbaar te zijn of contact met ons te houden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Hotelaccommodatie

Indien gewenst kunnen wij een kamer reserveren in het Hassotel aan een lager Feriduni tarief. Gelieve ons tijdig te informeren indien u wenst een reservatie te maken.

Scheren voor de behandeling

Het haar wordt voor een FUE behandeling door één van onze medische assistenten geschoren (0,9mm) tenzij er met micro- of macrostrips wordt gewerkt. U dient het haar dus niet van te voren te scheren.

